

### Vaccins : Préparation et Conservation Cabinets Médicaux et Officines

Vaccin	Stock général	Cabinet Médical ou Officine			
	Stockage	Stockage		Préparation*	Conservation
<b>Comirnaty Adulte JN.1</b> (Bouchon gris)	-90 °C à -60 °C	2-8°C 10 semaines	NON	6x <b>0,3ml</b> Seringue préparée <b>avant chaque injection</b>	<b>12h</b> entre 8-30°C après première ponction
<b>Comirnaty Pédiatrique JN.1 5-11 ans</b> (Bouchon orange)	-90°C à -60°C	2-8°C 10 semaines	+ 1,3ml NaCl 0,9%	10x <b>0,2ml</b> Préparer les 10 seringues <b>d'affilée</b>	<b>12h</b> entre 2° et 30° à partir de la dilution
<b>Comirnaty Pédiatrique JN.1 6 mois - 4 ans</b> (Bouchon jaune)	-90°C à -60°C	2-8°C 10 semaines	+ 1,1ml NaCl 0,9%	3x <b>0,3ml</b> Préparer les 3 seringues <b>d'affilée</b>	<b>12h</b> entre 2° et 30° à partir de la dilution
<b>Comirnaty Pédiatrique XXB.1.5 6 mois - 4 ans</b> (Bouchon marron)	-90°C à -60°C	2-8°C jusqu'à 10 semaines	+ 2,2ml NaCl 0,9%	10x 0,2ml Préparer les 10 seringues <b>d'affilée</b>	<b>12h</b> entre 2° et 30° à partir de la dilution
<b>Comirnaty Pédiatrique XXB.1.5 5-12 ans</b> (Bouchon orange)	-90°C à -60°C	2-8°C jusqu'à 10 semaines	+ 1,3ml NaCl 0,9%	10x 0,2ml Préparer les 10 seringues <b>d'affilée</b>	<b>12h</b> entre 2° et 30° à partir de la dilution
<b>Comirnaty Omicron XBB.1.5</b> (Bouchon gris)	-90 °C à -60 °C	2-8°C 10 semaines	NON	6x <b>0,3ml</b> Seringue préparée <b>avant chaque injection</b>	<b>12h</b> entre 8-30°C après première ponction

\* Veuillez consulter les différentes fiches de préparation pour plus de détails