

VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE

Coqueluche

La coqueluche provoque des formes sévères chez les < 1 an pouvant être très grave chez les < 3 mois nécessitant une hospitalisation

Quand ?


Au 2ème ou 3ème trimestre de la grossesse. Idéalement, **entre la 13ème et la 26ème** semaine de gestation. Au plus tard à la 36ème semaine

Quel vaccin ?

Vaccin di-Te-ap ou di-Te-ap-IPV

Pourquoi ?

Protection des nourrissons à >90% jusqu'à la vaccination à 6 semaines d'âge



RSV

1ère cause d'hospitalisations pédiatriques, 2ème cause de mortalité infectieuse chez les < 1 an

Quand ?

Entre **la 32ème et la 36ème** semaine de grossesse en cas de **grossesse harmonieuse (non gémellaire/non multiple)** et si l'accouchement est prévu entre septembre et février

Quel vaccin ?

Vaccin inactivé protéique bivalent (**Abrysvo®**)

Pourquoi ?

Protection des nourrissons pendant les 6 premiers mois de vie



Co-administration
Possible à des sites différents

Grippe

La grippe pendant la grossesse ↑ le risque d'hospitalisation grave et de 2 à 8 fois le risque d'hospitalisation

Quand ?

En **période hivernale**, quel que soit le stade de la grossesse
À chaque grossesse.

Quel vaccin ?

Vaccin inactivé adapté aux virus Influenza en circulation

Pourquoi ?

Risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré



COVID-19

Le Covid-19 ↑ le risque de complications durant la grossesse ou de naissance prématurée

Quand ?

Indiqué pour les **femmes enceintes avec comorbidités**
Pendant toute la grossesse à condition de respecter un délai de 6 mois après la dernière dose ou infection

Quel vaccin ?

Vaccin adapté au variant en circulation

Pourquoi ?

Risque de d'infection sévère en cas de facteur de risque ou de comorbidité



Co-administration
Possible à des sites différents