Septembre 2026

Grippe saisonnière - INFLUENZA

EPIDEMIOLOGIE

Virus Influenza A et B

- **Parmi les maladies infectieuses les plus courantes**
- **Cause d'épidémies hivernales d'infections respiratoires**

50 millions de cas par an dans l'UE / EEL
15 – 17 000 décès par an dans l'UE / EEL
290 – 650 000 décès par an dans le monde
Taux de mortalité de **13.8 par 100 000** cas

18 534 cas répertoriés en 2024/2025
2 162 cas chez les > 65 ans
78 décès enregistrés en 2024/2025

28 000 décès par an chez les < 17 ans
Surtout chez les **< 4 ans**

Pic en 2022 avec **6 496 cas** répertoriés
Surtout chez les **> 5 ans**
Hospitalisations prévalentes chez les **< 4 ans**

VACCINATION

Organisation mondiale de la Santé

L'OMS a comme objectif une **couverture vaccinale** de **75%** chez les **> 65 ans**

Au Luxembourg, la **couverture vaccinale** s'élève à **42%** chez les **> 65 ans** (2024)

CSMI Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses

Le CSMI recommande la vaccination pour :

- Les personnes âgées **> 65 ans**
- Les personnes âgées **< 65** ans présentant des **comorbidités**
- Les enfants de **2 à 17 ans**
- Les enfants de **> 6 mois** présentant des **comorbidités**
- Les **femmes enceintes**

EN PRATIQUE

Vaccination saisonnière à partir d'octobre

SD : Vaccins trivalents à dosage standard
HD : Vaccin trivalent à haute dose
ADJ : Vaccin trivalent adjuvanté
LAIV: Vaccin trivalent vivant atténué
IM : intramusculaire/**IN** : intranasal

Population cible	Type de vaccin / administration	Schéma
> 65 ans	HD (ou ADJ)/IM	Rappel annuel
18-64 ans avec comorbidités	SD/IM	Rappel annuel
> 6 mois - 23 mois avec comorbidités	SD/IM	• ***Jamais vaccinés*** : 2 doses la première saison de vaccination, à 4 semaines d'intervalle. • ***Déjà vaccinés*** : 1 dose annuelle saisonnière.
2 à 17 ans	LAIV/IN (ou SD/IM)	**Jusqu'à 8 ans inclus :** • Jamais vaccinés : 2 doses la 1e saison de vaccination, à 4 semaines d'intervalle • Déjà vaccinés : 1 dose annuelle saisonnière. **À partir de 9 ans :** 1 dose annuelle saisonnière. Pour l'administration IN : 1 pulvérisation par narine
Femmes enceintes	SD/IM	Rappel annuel

Sources: Recommandations du CSMI sur la Vaccination contre la grippe saisonnière des personnes âgées de 65 ans et plus d'août 2025 et pour la vaccination contre la grippe saisonnière chez les enfants et adolescents d'octobre 2025