

D'Koloskopie

BEREET IECH OP
D'ËNNERSICHUNG VIR

DAARMKRIIBS ASS
DÉI ZWEEHTEEFEGST
KRIIBSERKRANKUNG
ZU LËTZEBUERG



 Programme
Dépistage
Cancer colorectal



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

Wat ass eng Koloskopie?	3
Firwat soll ech eng Koloskopie maache loosse?	4
Wou kann ech eng Koloskopie maache loosse a vu wien?	5
Wéi huelen ech e Rendez-vous fir d’Koloskopie?	6
Wéi eng Dokumenter muss ech fir mäi Rendez-vous mathuelen?	6
Precautioun fir d’Koloskopie	7
Wéi bereeden ech mech op d’Koloskopie vir ?	7
Am Prakteschen	8
Oflaf vun der Ënnersichung	12
Iwwerwaachung no der Koloskopie	12
Risiken a Komplikatiounen vun der Koloskopie	13
Hygiène a Sécherheet	14
Awëllegung	14
Bedelegung un de Käschten	14
De Screening- Programm	15



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé


Edition November 2023

ISBN 978-2-919797-40-0

Ären Dokter huet lech geroden, eng Koloskopie maachen ze loossen, déi gläich usteet. Fir dass Dir genau iwwert den Oflaf vun dëser medezinescher Prozedur Bescheed wësst, liest wgl. dëst Dokument opmierksam duerch. Ären Dokter kann lech zu all Moment weider Prezisiounen zum Sujet ginn.


Wat ass eng Koloskopie?

Bei enger Koloskopie gëtt dee bannenzegen Deel vun Ärem Déckdaarm mat Hëllef vun engem beweeglechen Tüb mat enger Videokamera, also engem Endoskop oder Koloskop, gekuckt. Zil vun dëser Ënnersuchung ass virun allem Polypen z'entdecken an dës wa méiglech direkt ewechzehuelen. Polypen si kleng Wucherungen un der Daarmhaut, déi mat der Zäit evoluéieren an zu Daarmkriibs degeneréiere kënnen. D'Reussite vun der Ënnersuchung hängt vun enger gudder Virbereedung vun Ärem Daarm of.



Firwat soll ech eng Koloskopie maache loossen?

Et ass de Referenz-Exame fir eng Feinënnersichung no engem Stulltest mat Hiweis op Blutverloscht. Et ass och den éischten Test, dee bei Persoune mat héijem Risiko op Daarmkriibs duerchgefouert gëtt. Während der Koloskopie kënnen vum Dokter detektéiert Lésioune als Prouf fir eng Analys am Labo oder eng Biopsie geholl ginn. Bei engem klengen Polyp kann dësen och direkt ewechgeholl ginn, éier en zu Kriibs degeneréiert.



EWECCHUELE VU POLYPPEEN

Och wann d'Ënnersichung vollstänneg duerchgefouert gëtt, kënnen kleng Lésioune onbemierkt bleiwen a sech an de Méint dono developpéieren. Dofir recommandéiere mir de FIT-Test (Stulltest) all 2 Joer ze widderhuelen. Ären Dokter kann Iech awer och direkt eng weider Kontroll-Koloskopie recommandéieren: et ass wichteg, sengem Avis ze follegen.

**AM
UFANKSSTADIUM
WEIST DAARMKRIIBS
NET ËMMER
SYMPTOMER OP**

**DUERCH
ENG KOLOSKOPIE
KËNNEN DÉI MEESCHT
DAARMKRIIBS-
ERKRANKUNGEN
ENTDECKT GINN!**

Wou kann ech eng Koloskopie maache loossen a vu wiem?

Eng Rëtsch Zenteren a Fachmedezinner (Gastroenterologen an Internisten) si vum Gesondheetsministère agreéiert, fir Koloskopien am Kader vum Screening-Programm duerchzeféieren.

D'Lëscht vun den agreéierten Zenteren a Medezinner kritt Dir bei Ärem Hausdokter oder op www.sante.lu. Den Agreement garantéiert dass d'Qualitéits- a Sécherheetskrittären bei der Realisatioun vun der Koloskopie agehale ginn. Dir fannt d'Krittäre vum Agreement vun den Zenteren an de Medezinner och op www.sante.lu.

Dir kënnt den Zenter an de Medezinner fir Är Koloskopie fräi wielen.

Wann Dir lech fir ee Medezinner entscheet, deen net agreéiert ass, da kënnt Dir d'Koloskopie trotzdeem maache loossen, mee se gëtt dann net am Kader vum PDOCCR (mat anerem Remboursement) realiséiert.



**BEI FROEN,
ADRESSÉIERT
IECH UN DE
KOORDINATIIONS-
ZENTER:
247-75550**

Wéi huelen ech e Rendez-vous fir d'Koloskopie?

Huelt e Rendez-vous am Zenter vun Ärem Choix a gitt dobäi un, **dass et eng Koloskopie** no engem anormale Resultat vun engem Test op Bluttspueren am Stull (FIT-Test) **am Kader vum nationale Programm ass**. Dir kritt dann ee Rendez-vous fir d'Koloskopie, wa méiglech, bannent 30 Deeg.

Haalt Är Carte d'identité an Är Sozialversécherungskaart bereet, fir Är exakt Coordonnéeën (Numm, Virnumm, Matricule) kënnen unzeginn.

Den agreéierten Zenter oder Medezinner deelen lech den Datum an d'Auerzäit vun Ärem Rendez-vous mat. Hei kritt Dir och eng Ordonnance fir den Daarm-Preparatiouns-Produit an d'Apdikt sichen ze goen, an d'Consignen, déi Dir beim Drénke vun dëser Preparatioun respektéiere musst.

D'Koloskopie kann och ënner Anästhesie duerchgefouert ginn: an deem Fall kritt Dir e Rendez-vous fir eng Consultatioun virun der Anästhesie fir all néideg Informatiounen zu dëser medezinescher Prozedur opzehuelen.

Wéi eng Dokumenter muss ech fir mäi Rendez-vous mathuelen?

- ☒ D'Ordonnance fir eng Koloskopie, ënnerschriften vun Ärem Dokter oder d'Resultat vun Ärem FIT-Test +.
- ☒ Är Sozialversécherungskaart an Är Carte d'identité
- ☒ D'Lëscht vun de Medikamenter déi Dir reegelméisseg anhuelt

Precautionne fir d'Koloskopie

Wann Dir Medikamenter géint d'Bluttgerënnung (Clexane®, Sintrom®, Plavix®...), Aspirin, Entzündungshemmer (Diclofé-nac®, Celebrex®, Arcoxia®...), oder Insulin huet, da beschwätzt dat mat Ärem Dokter op d'mannst 2 Woche virun Ärem Rendez-vous fir d'Koloskopie, fir dass hien/si, wann néideg, den Traitement virum Examen entsprechend Ärem Gesund-heetszoustand upasse kann.



Vergiesst net Ärem Dokter all Medikamenter matzedeelen, déi Dir anhuet, an ze preziséieren, wann Dir Allergien oder soss Krankheeten hutt, besonnesch Härerproblemer oder Diabetes mat Insulin-Traitement.

Wéi bereeden ech mech op d'Koloskopie vir?

Fir d'Qualitéit an d'Sécherheet vum Examen ze garantéieren, ass et immens wichteg dass Ären Daarm absolut propper ass.

Fir Reschtbestänn am Daarm z'eliminéieren, ass et néideg während 3 Deeg virum Examen ee spezielle Regimm anzehalen an eng flësseg Preparatioun ze drénken, déi lech vum Dokter, deen d'Koloskopie maache wäert, verschriwwen kann ginn an déi Dir an der Apdiktt kritt.



**3 DEEG VIRUM
EXAMEN MUSS EE
SPEZIELLE REGIMM
AGEHALE GINN**

Am Prakteschen

1

BALLASTSTOFFAARME REGIMM, DEEN 3 DEEG VIRUM EXAMEN AGEHALE MUSS GINN

Keng Liewensmëttel mat Ballaststoffer, keng Kären oder Som méi iessen. D'Kären am Daarm, zesumme mat der Botzflëssegheet, kënnen beim Ofsaugen de Kanal vum Endoskop blockéieren, wat dozou féiert, dass d'Koloskopie muss ënnerbrach ginn.

Verbuede Liewensmëttel: Uebst a Geméis (weder réi nach gekacht), a besonnesch déi mat Kären, wéi Kiwi, Tomaten, Drauwen, Kornschong, etc. Evitéiert och Käre wéi déi am Müsli, am Vollkarbrout oder am Gebeess.

Erlaabte Liewensmëttel: Wäisst Fleesch a Fësch, Eeër, wäisst Brout, Nuddelen, wäisse Räis, Gromperen a Mëllechprodukte wéi Mëllech, Kéis oder Jugurt.

2

DE REGIMM UM DAG VIRUM EXAMEN

Den Dag virum der Koloskopie musst Dir mëttes eppes Liichtes iessen (ouni Käre-Produiten): klore Bouillon, wäisst Brout mat Stoffi oder Gebeess als Jelli oder Hunneg, wäisse Räis, Nuddelen, Naturjugurt, Pudding ouni Kären.


Fir ze drénken: Kaffi, Téi, Waasser ouni Spruddele. Jus mat Fruuchtfleesch gëllt et z'evitéieren.

Wann **Är Koloskopie den Dag drop moies** ass, dann dierft Dir owes näischt méi iessen.

Wann **Är Koloskopie den Dag drop am Nomëtteg** ass, da kënnst Dir owes eppes Liichtes iessen (ouni Käre-Produiten): klore Bouillon, wäisst Brout mat Stoffi oder Gebeess als Jelli oder Hunneg, wäisse Räis, Nuddelen, Naturjugurt, Pudding ouni Kären.

D'Daarmspülung als Virbereedung vun Ärem Daarm kann mat enger **Preparatioun** op Polyethylenglycol-Basis **fir ze drénke** gemaach ginn. Dëst ass ee salzeg schmaachende Laxatif, dat opgrond vun den Elektrolyten (Salzer) déi dra sinn. D'Elektrolyten déngen dozou, e Verloscht un Natrium oder Kalium oder Waasser bei der Virbereedung vum Daarm z'évitéieren. Dës Salzer hu kee bedeitenden Afloss op de Blutdruck. Wann Dir eng dekompenséiert Häerz- oder Nierenënnerfunktioon hutt, oder wann Dir allergesch op d'Bestanddeeler sidd, da musst Dir dat dem Dokter matdeelen, deen d'Koloskopie duerchféiert: dës proposéiert lech dann eng Preparatiounsflëssegkeet déi Ärer Situatioun ugepasst ass.

D'Preparatioun, déi déi aktiv Moleküll („Macrogol“) enthält, existéiert ënnert der Form vu verschiddene pharmazeutesche Produiten: Klean Prep® Moviprep®, Colofort®, Endofalk®



Den Dokter, deen Är Koloskopie duerchféiere wäert, wielt ee vun deene Produiten aus. Generell sinn dat Sachete mat Pudder, dat a plattem Waasser opgeléist gëtt. Hie wäert lech, zesumme mat der Ordonnance fir de Produit an der Apdikt ze kafen, och déi entspreichend Consigné matginn, fir de Produit ze preparéieren an ze drénken.

Et ass wichteg ze betounen datt d'Wiel vun der Virbereedung vun Dokter zu Dokter variéiere kann. Hien oder Sie kéint lech also aner Optioune proposéieren. Zéckt net mat him oder hier ze diskutéieren.

Éier Dir d'Preparatiounsflëssegkeet zoubereet, liest d'Gebrauchsanweisung, d'Konterindikatiounen an d'Niewewirkunge grëndlech duerch. Wann eng Konterindikatioun lech concernéiert, rufft dem Dokter un, deen d'Koloskopie duerchféiere wäert, fir dësen ëm Rot ze froen.

Consignen, déi Dir respektéiere musst: D'Anhuele vun der Preparatiounsflëssegkeet variéiert jee nodeem ob Är Ënnersichung moies oder am Nomëtteg duerchgefouert gëtt.

- Ab deem Moment wou Dir ufänkt d'Preparatioun ze drénken, dierft Dir näischt méi iessen.
- Frot Ären Dokter ëm Rot wat Är aner Medikamenter betrëfft; allgemeng sollt Dir, kuerz éier Dir ufänkt d'Preparatioun ze drénken, keng Pëllen méi anhuelen, well dës soss den Verdauungstrakt séier passéieren an net voll absorbéiert kënne ginn. Se sinn also onwierksam. Generell gëtt ugeroden, dës op d'mannst 2 Stonne éier Dir ufänkt d'Preparatioun ze drénken, oder 2 Stonnen nodeem Dir de leschte Liter gedronk hutt, anzehuelen.

A

GÛTT ÄR KOLOSKOPIE **MOIES** DUECHGEFOUERT?
 = D'PREPARATIOUN GÛTT VERDEELT GEDRONK

J -3	J -2	J -1	JOUR DE L'EXAMEN
Regimm	Regimm	- Regimm - Tëscht 17:00 an 20:00 Auer: 3/4 vun der Preparatioun drénken an näischt méi iessen	- Moies näischt iessen - De Rescht vun der Preparatioun drénken 3 Stonne virum Rendez-vous ophalen

Fänkt den Dag virun der Ënnersichung géint 17:00 Auer un d'Preparatioun ze drénken. Et gött ugeroden tëschent 17:00 an 20:00 Auer unzufänken (ongeféier 3/4 vun der gesamter Preparatioun). Allgemeng musst Dir 1 bis 2 Stonnen dono op d'Toilette, an déi ganz Prozedur dauert 4 bis 5 Stonnen, jee nodeem wéi schnell de Produit verdaut gött. Bleift also an der Géigend vun enger Toilette. Wann Dir géint 17:00 Auer ufänkt de Produit ze drénken, **dann ass d'Preparatiounsphas géint 22:00 Auer fäerdeg**. Dir kënnt d'Preparatioun awer och méi spët ufänken, mee da riskéiert Dir een onrouegen Owend oder eng onroueg Nuecht.

Um Moie vun der Ënnersichung musst Dir 3 Stonne virum Rendez-vous de Rescht vun der Preparatioun drénken (ongeféier 1/4 vun der gesamter Preparatioun). Stullreschter vun der Nuecht wäerten esou virun Ärer Koloskopie eliminéiert ginn.

B

GÛTT ÄR KOLOSKOPIE **AM NOMËTTEG** DUECHGEFOUERT?
 = D'PREPARATIOUN GÛTT NET VERDEELT GEDRONK

J -3	J -2	J -1	JOUR DE L'EXAMEN
Regimm	Regimm	Regimm	- Moies näischt iessen - Déi ganz Preparatioun drénken

Fänkt um Dag **vun Ärer Ënnersichung géint 8:00 Auer un** d'Preparatioun ze drénken.

Léist all Sachet an engem Liter platt Waasser op an **drénkt d'Preparatioun** wa méiglech bis 12:00 Auer mëttes. Allgemeng musst Dir 1 bis 2 Stonnen dono op d'Toilette, an déi ganz Prozedur dauert 4 bis 5 Stonnen, jee nodeem wéi schnell de Produit verdaut gött.

Bleift also an der Géigend vun enger Toilette.

4

E PUER PRAKTESCH ROTSCHLÉI FIR D'PREPARATIOUN BESSER ZE VERDROEN

- D'Preparatioun léist sech méi einfach drénken, wa se **kal** ass. Preparéiert se am viraus a stellt se an de Frigo.
- Wann dee salzege Vanillsgeschmaach lech stéiert, kënnt Dir ee **Sirop** bäiginn (z. B. Menthe, Grenadine, Zitroun, etc).
- Dir kënnt de Geschmaach awer och iwwerdecken andeems Dir eng staark **Kamell** lutscht.
- Wann et lech schlecht gött deelt d'Preparatioun a **méi kleng Dosissen** an.
- Benotzt eng **Crème** fir Hautirritatiounen um Anus, wéinst dem flässege Stullgang, ze verhënneren.
- Wann Dir d'Preparatioun net verdroe sollt, frot beim Zenter, wou Dir d'Koloskopie duerchféiere loosst, ëm Rot. Wann de Problem weider besteet a wann Dir d'Preparatioun net vollstänneg drénke kënnt, kontaktéiert den Dokter, deen d'Koloskopie duerchféiere soll, fir iwwert eng Alternativ Preparatiounsmethod ze schwätzen.

5

WANN ÄREN DAARM ONGENÜGEND PREPARÉIERT GOUF

Wann nach Stullréckstänn an Ärem Daarm sinn, kann den Dokter Är Daarmhaut net uerdentlech ënnersichen an e kann net gesinn, ob Polypen ewechgeholl musse ginn. En decidéiert dee Moment, fir d'Koloskopie ofzebriechen a proposéiert lech een aneren Dag erëm-zekommen, nodeems Dir eng vollstänneg Preparatioun ofgeschloss hutt.

**DUERCH D'ANHALE
VUN ENGEM STRIKTE
REGIMM AN DUERCH
D'DAARMSPÜLUNG
KANN ÄR KOLOSKOPIE
ËNNERT OPTIMALE
BEDÉNGUNGEN
DUERCHGEFOUERT
GINN**

Oflaf vun der Ënnersichung

Während der Ënnersichung läit Dir op der Säit oder um Réck. Den Endoskop (beweeeglecht Gerät mat enger Kamera) gëtt an den Anus agefouert.

D'Koloskopie dauert ongeféier 20 Minuten. Fir dass d'Ënnersichung méi agreabel fir Iech ass, a fir den Oflaf ze vereinfachen, kënnt Dir ee Berouegungsmëttel kréien. Während der Ënnersichung gëtt CO₂ an den Daarm geblosen, fir dass d'Daarmhaut besser ze gesinn ass.



No der Ënnersichung kann d'Loft am Daarm zäitweis zu engem opgeblösende Bauch féieren. Wann Dir no der Ënnersichung doheem Péng hutt, kontaktéiert den Endoskopie-Service iwwert d'Telefonnummer, déi Iech matgedeelt gouf. Wann de Problem ausserhalb vun den Öffnungszäiten optrëtt, kontaktéiert d'Urgence vum Spidol, dat Garde huet.

Wann Dir d'Ënnersichung ënnert staarker Sedéierung oder Vollnarkos duerchféiere loosse wëllt, dann ass eng speziell Consultatioun am Virus mat engem Anästhesist néideg. Gitt dëst un, wann Dir Äre Rendez-vous huet.

Iwwerwaachung no der Koloskopie

Wann Dir keng Sedéierung oder Vollnarkos hat, kënnt Dir direkt no der Ënnersichung heem oder op d'Aarbecht goen.

Wann Dir sedéiert gouft oder eng Vollnarkos hat, musst dir normalerweis während 1 bis 3 Stonnen no der Ënnersichung am Iwwerwaachungsraum waarden, éier dir heem dierft. Eng méi laang Iwwerwaachung kann néideg sinn, wann eng Polypektomie (Ewechhuele vu Polypen) néideg war. D'Iwwerwaachungsdauer gëtt vum Dokter fixéiert.


Wann Dir ee Berouegungsmëttel krut, sedéiert gouft oder eng Vollnarkos hat, dann dierft Dir net selwer fueren. An deem Fall muss eng aner Persoun Iech heem féieren.

Risiken a Komplikatoune vun der Koloskopie

All medezineschen Agrëff kann zu Komplikatoune féieren, och wann dësen entsprechend de Kompetenz- a Sécherheetsnormen nom aktuelle Stand vun der Wëssenschaft an den entspreche Vierschrëften duerchgefouert gouf.

**KOMPLIKATIOUNE
BEI ENGER
KOLOSKOPIE
SI RAR**

- Eng Perforatioun vum Daarm, eng schwéier Komplikatoun vun der Koloskopie, ass ganz seelen a muss an der Reegel chirurgesch noutfallversuergt ginn.
- Eng schwéier Bluddung no enger Polypektomie ass seelen. Dës kann duerch eng Tendenz zu Bluddungen oder duerch Medikamenter géint Blutgerënnung begënschtegt ginn. Eng endoskopesch oder chirurgesch Interventioun an/oder Transfusioune kënnen hei néideg sinn.
- Weider méiglech mee seele Komplikatoune si kardiovaskulär Problemer, Stéierunge bei der Ootmung oder eng Infektioun. Den Infektiounsrisiko ass immens kleng, well strikt Desinfektiounsprozeduren no all Benotzung vum Endoskop agehale ginn a well d'Material fir Polyppen oder kriibsaartege Lesiounen ewechzehuelen no eemolegem Gebrauch ewechgehet gëtt.



Dës Komplikatoune trieden an der Reegel direkt no der Koloskopie op, se kënnen awer och eréischt e puer Deeg no der Ënnersichung optrieden.



Wa Bluddungen, Bauchwéi, Féiwer oder aner anormal Symptomer optrieden, och an den Deeg no der Ënnersichung, kontaktéiert esou séier wéi méiglech den Dokter, deen d'Koloskopie duerchgefouert huet, oder gitt an d'Urgence vun engem Spidol.

Hygiène a Sécherheet

Fir Är Sécherheet ze garantéieren halen den Zenter an den Dokter, deen Dir ausgewielt hutt fir Är Koloskopie duerchzeféieren, strikt Hygiènes- a Sécherheetsnormen an, besonnesch wat d'Desinfektioun an d'Botze vum Koloskop ugeet. Si verflachte sech Material fir Polypen oder kribbsaarteg Lésioune ewechzehuelen no eemolegem Gebrauch ewechzegehen.

Awëllegung

Éier d'Koloskopie duerchgefouert gëtt, musst Dir eng Awëllegung ënnerschreiwen, déi Dir dem Dokter ofgitt, deen d'Koloskopie wäert duerchféieren. Mat dëser Ënnerschrëft confirméiert Dir, dass Dir déi néideg Informatiounen iwwert d'Koloskopie krut, dass Dir Froen un den Dokter stelle konnt an dass Dir d'Virdeeler an d'Risiko vun der Ënnersichung verstanen hutt.

**BEI FROEN,
ADRESSÉIERT
IECH UN DE
KOORDINATIIONS-
ZENTER:
247-75550**



Bedelegung un de Käschen

Är finanziell Bedelegung un der Duerchféierung vun der Koloskopie:

- An der Apdik bezuelt Dir een Deel vum Präis vum Daarm-Preparatiouns-Produit (60%), deen aneren Deel gëtt vun Ärer Krankekeess iwwerholl.
- Wann Dir d'Koloskopie ouni Sedéierung duerchféiere loosst, bezuelt Dir d'Ënnersichung beim Dokter, deen d'Koloskopie duerchféiert. Dir gitt dono vun der Krankekeess rembourséiert. Wann Är Koloskopie mat Sedéierung oder Vollnarkos duerchgefouert gëtt, da kann den Dokter op den Tiers payant zeréckgräifen. D'Spidol freet dann eng Bedelegung un de Käschen.

De Screening-Programm

ZILER

- 1 D'Stierflechkeet vum Daarmkriibs reduzéieren.
- 2 Den Daarmkriibs fréizäiteg erkenne fir d'Patiente méi liicht behandeln ze kënnen.
- 3 D'Entwécklung vu Kriibs verhënneren, duerch d'Ewechhuele vu Polypen.

GESTIOUN

De Gesondheetsministère ass zoustänneg fir d'Ausféierung vum Daarmkriibs-Fréierkennungsprogramm, seng nodréiglech Evaluatioun an d'Veaarbechtung vu perséinlechen Donnéeën. De Programm gëtt an Zesummenaarbecht mat der Gesondheetskeess (CNS) organiséiert.

Am Prakteschen, gëtt de Screening-Programm vun engem Koordinatiounszenter fir Kriibs-Fréierkennungsprogrammer (Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers) geréiert an ausgefouert, deem der Gesondheetsdirektioun am Gesondheetsministère ënnerstellt ass.

PERSÉINLECH DONNÉEËN

Är perséinlech Donnéeën a medezinesch Informatiounen am Kader vun Ärer Koloskopie, inklusiv d'Resultat vum Screening, gi vum Dokter, deem Är Koloskopie realiséiert huet, a vum Laboratoire deem d'Prouwen analyséiert, un Ären Dokter vum Vertrauen geschéckt, esou wéi un den zoustännegen Dokter vum Daarmkriibs-Fréierkennungsprogramm fir de Suivi vun Ärem Screening ze garantéieren. Des Donnéeë ginn dono pseudonymiséiert a vertraulich veraarbecht, fir d'Effikassitéit vum Screening-Programm an e Verglach mam nationale Kriibs-Regëster z'erméiglechen.

Wann Dir tëscht zwee Screeningen eng Koloskopie gemaach hutt, schéckt d'Gesondheetskeess dem zoustännegen Dokter vum Screening-Programm e puer Informatiounen zu dëser Ënnersichung (Datum, Adress, Numm vum Dokter deem d'Koloskopie verschriwwen huet, an Numm vum Dokter dee se duerchgefouert huet). Mat dësen Donnéeë kann d'Frequenz vun Ären Ënnersichungen adaptéiert ginn.

Geméiss dem Gesetz vum 2. August 2002 zum Persouneschutz am Kader vun der Veraarbechtung vu perséinlechen Donnéeën, behaalt Dir d'Recht op Är Donnéeën zouzepräifen, dës verbesseren ze loossen an d'Recht lech der Veraarbechtung vun Ären Donnéeën z'opposéieren. Adresséiert lech dofir un de Koordinatiounszenter fir Kriibs-Fréierkennungsprogrammer (Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers).



FIR WEIDER FROEN ZUM SCREENING-PROGRAMM:

- Kontaktéiert de **Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers**
Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,
Direction de la santé
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél.: (+352) 247 755 50
E-mail: colorectal@ms.etat.lu
- Consultéiert **www.sante.lu**