

WAT DIR IWWER PROSTATT- KRIIBS WËSSE SOLLT

*Warnzeechen
déi Dir net
ignoréiere sollt!*



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

D'ZUELEN	3
D'PROSTATT	4
DÉI GUTTAARTEG PROSTATT-KRANKHEETEN	5
<i>Guttaarteg Hypertrophie vun der Prostatt</i>	5
<i>Prostatite</i>	6
DE PROSTATT-KRIIBS	7
<i>Risiko Faktoren</i>	7
<i>Symptomer</i>	8
DIAGNOSTESCH TESTER FIR PROSTATT-KRIIBS	9
<i>PSA (Prostate-Specific Antigen - Prostatt-spezifischen Antigen)</i>	9
<i>Rektal Ënnersichung</i>	10
<i>IRM</i>	10
<i>Biopsie vun der Prostatt</i>	10
D'BEHANDLUNGE BEI PROSTATT-KRIIBS	11
D'HEELUNG AN D'IWWERLIEWEN	11
GUTT ZE WËSSEN	12



Ab engem Alter vu ronn 50 Joer triede Verännerungen an der Prostatt bei ongeféier all zweitem Mann op. Meeschtens handelt et sech just ëm eng guttaarteg Vergréisserung vun der Drüs. Heiansdo ass d'Lesioun awer och béisaarteg.

D'ZUELEN

Prostatt-Kriibs ass deen heefegste Kriibs bei Männer zu Lëtzebuerg.

D'Heefegkeet, dat heescht d'Unzuel vun neie Fäll, erreecht e Maximum tëscht 75 a 79 Joer. D'Stierflechkeet, ass am héichsten bei Männer vu 85 Joer a méi.


Mat 520 neie Fäll pro Joer ass Prostatt-Kriibs deen heefegste Kriibs, dee bei Männer diagnostizéiert gëtt. Wat d'Stierflechkeet ugeet, klasséiert dës Kriibs sech 2019 mat 55 Doudesfäll op der 2. Plaz (Quell: Registre National du Cancer, Luxembourg).

D'PROSTATT

D'Prostatt ass eng Drüs vun 3 op 4 cm, déi sech am klengen Becken, ënnert der Blos a virum Rektum befënnt. Si ëmschleesst d'Harnröhr an ass Deel vun de männleche Geschlechtsorganen.

Si entwéckelt sech a schafft ënnert dem Afloss vu männlechen Geschlechtshormonen (besonnesch dem Testosteron).


Si scheet eng Flëssegkeet aus, déi sech während der Ejakulatioun mat de Spermazellen vermëscht, déi vun den Hoden produzéiert ginn. Sou bedeelegt d'Prostata-Flëssegkeet an der Zesummesetzung vum Sperma.



DÉI GUTTAARTEG PROSTATT-KRANKHEETEN

GUTTAARTEG HYPERTROPHIE VUN DER PROSTATT

Déi guttaarteg Vergréisserung vun der Prostatt, benigne Hypertrophie vun der Prostatt genannt, ass altersbedéngt. Tatsächlech, hält Prostatt am Alter dacks u Volume zou an ännert sech an der Konsistenz.




D'Krankheet kann ënnert anerem déi follgend Symptomer presentéieren:

- ☐ Schwieregkeete beim Waasserloossen
- ☐ Reduzéierten Drock beim Urinéieren
- ☐ Onfäegkeet d'Blos komplett eidel ze maachen
- ☐ Staarkt an / oder heefegt Bedierfnes Waasser ze loossen
- ☐ Verléiere vun Urin
- ☐ Heefegt Waasserloossen an der Nuecht

Fréi diagnostizéiert, kann déi guttaarteg Vergréisserung vun der Prostatt an de meeschte Fäll mat Medikamenter behandelt ginn. Wann dës Behandlung net duer geet oder d'Krankheet scho fortgeschratt ass, kann eng chirurgesch Interventioun déi gewünschten Erliichterung bréngen.

PROSTATITE

D'Prostatite ass eng Entzündung vun der Prostata, déi an all Alter optriede kann. Si kann duerch eng Infektioun oder eng Entzündung verursacht ginn a kann a bestëmmte Fäll chronesch ginn.



D'Krankheet kann ënnert anerem déi follgend Symptomer presentéieren:

- ☐ Brennen oder Péng beim Urinéieren
- ☐ Präsenz vu Blut am Urin oder Sperma
- ☐ Ausfloss aus der Harnröhr
- ☐ Sexuell Stéierungen
- ☐ Widderschuelte Infektiounen vun den Harnweeër
- ☐ Péng am klengen Becken oder am ënneschte Réck

Den Dokter ka verschidde Medikamenter benotzen ofhängeg vun der Ursach an dem Patient sengen Symptomen.


DE PROSTATT-KRIIBS

Prostatt-Kriibs wiisst normalerweis ganz lues. Prostatt-Zelle verännere a multiplizéieren sech onkontrolléiert. Den normale Tissue vun der Prostatt gëtt dann duerch den Tumeur zerstéiert, dee wiisst. Iwwert Blut oder Lymphgefäässer kënnen sech Kriibszellen an aneren Organer fixéieren an do nei Tumore bilden (Metastasen). Et sinn haaptsächlech Lymphdrüsen am Becken a Schanken déi betraff sinn.


Risiko Faktoren

Déi Haaptrisikofaktore fir Prostatt-Kriibs sinn:


- ☐ **Alter**
méi heefeg
bei eelere Männer
- ☐ **Ethnie**
méi heefeg bei Männer
vun afrikanescher
Hierkonft
- ☐ **Hereditär Faktoren**
BRCA 1 a BRCA 2
Genmutatiounen,
familiär Virgeschicht




Stadium 1



Stadium 2



Stadium 3



Stadium 4

Symptomer

Hei sinn d'Symptomer, déi am Fall vu Prostatt-Kriibs observéiert ginn an déi änlech wéi déi vu guttaartege Prostatt-Krankheete sinn, nämlech:

- ☐ Schwieregkeete beim Waasserloossen
- ☐ Reduzéierten Drock beim Urinéieren
- ☐ Onfäegkeet d'Blos komplett eidel ze maachen
- ☐ Staarkt an / oder heefegt Bedierfnes Waasser ze loossen
- ☐ Verléiere vun Urin
- ☐ Heefegt Waasserloossen an der Nuecht
- ☐ Brennen oder Péng beim Urinéieren
- ☐ Blut am Urin oder Sperma
- ☐ Sexuell Stéierungen
- ☐ Péng am klengen Becken oder ënneschte Réck
- ☐ Middegkeet

Well d'Symptomer net spezifesch sinn, ass eng medezinesch Ënnersuchung néideg fir déi richteg Diagnos ze stellen.

DIAGNOSTESCH TESTER FIR PROSTATT-KRIIBS

D'Detektioun vu Prostatt-Kriibs ëmfaasst e PSA (Prostatt-spezifischen Antigen) Test an eng rektal Ënnersuchung. Wann no dësen zwou Ënnersuchungen eng Anomalie festgestallt ginn ass, muss d'Diagnos duerch eng Biopsie vun der Prostatt gestallt ginn. Virun der Biopsie kann, wann néideg, een IRM gemaach ginn.

PSA (*Prostate-Specific Antigen - Prostatt-spezifischen Antigen*)

De PSA ass e Protein deen nëmme vu Prostatt-Zelle produzéiert gëtt a säi Wäert gëtt op Basis vun enger einfacher Blutanalys bestëmmt. Bei verschiddene Krankheete vun deem Organ si gréisser Quantitéite PSA am Blut feststellen. Kriibszelle sinn zum Beispill fäeg zéng Mol méi PSA ze produzéiere wéi normal Prostatt-Zellen.

Eng Erhéijung vum PSA-Wäert bedeit allerdéngs net onbedéngt d'Präsenz vu Prostatt-Kriibs. Vill Faktore kënnen eng Erhéijung vun deem Wäert verursaachen, sou wéi eng guttaarteg Vergréisserung vun der Prostatt, eng Prostatite, awer och sexuell Aktivitéit oder intensiivt Vëlofueren.

Nëmmen Ären Dokter kann d'Resultater vun der Ënnersuchung korrekt interpretéieren an lech iwwer eventuell Moossname beroden. Et ass ëmmer wichteg fir en erhéichte Wäert no 2 bis 4 Wochen ze iwwerpräiwen.

Am Fall vun engem héije PSA-Wäert wäert Ären Dokter mat lech iwwer weider Moossnamen diskutéieren:

- ☐ Reegelméisseg PSA-Kontrollen
- ☐ Consultatioun bei engem spezialiséierten Dokter an der Urologie (engem Urolog)

Rektal Ënnersichung

Dëst ass eng séier Ënnersichung, duerchgefouert mam Zeigefanger, besteet aus dem Oftaaschte vun der Prostatt iwwert de Rektum. Et erlaabt dem Dokter Onreegelméissegkeeten an der Drüs z'entdecken. Dës Onreegelméissegkeeten, verbonne mam PSA-Wäert kënnen dozou féieren datt Ären Dokter zousätzlech Tester ordonéiert.

IRM

Den IRM vun der Prostatt ass virun enger Biopsie noutwendeg, wann de PSA-Wäert liicht erhéicht ass. Dës radiologesch Technik erméiglecht et anatomesch Deeler vun der Prostatt an den dräi Ebenen ze visualiséieren.

Si mécht et méiglech verdächtig Beräicher z'identifizéieren, an deenen d'Biopsie méi geziilt gemaach ka ginn.

Biopsie vun der Prostatt

D'Biopsie vun der Prostatt gëtt entweder transrektal gemaach (d'Nol gëtt duerch de Rektum an d'Prostatt agefouert) oder transperineal (d'Nol gëtt duerch d'Haut tëscht dem Hodesak an dem Anus an d'Prostatt agefouert). D'Fragmenter déi erausgeholl ginn, ginn analyséiert fir de Kriibs z'identifizéieren, awer och fir ze kucken wéi aggressiv dës ass.

An der Praxis dauert dës Ënnersichung ongeféier fofzéng Minutten: si gëtt am Kader vun der externer Behandlung duerchgefouert, dacks ënner lokaler Anästhesie. Méi seelen erfuerdert si eng ambulant Chirurgie.

D'BEHANDLUNG BEI PROSTATT-KRIIBS

Bei lokaliséierten Tumeuren, bidden d'Chirurgie an d'Be-
strahlung exzellent Resultater. Heiansdo kann et néideg sinn,
zousätzlech eng hormonell Behandlung (Medikamenter)
oder eng Chemotherapie ze maachen. All Kriibsbehandlung
gëtt individuell op den Alter vum Patient, de Stadium vun der
Krankheet a perséinlech Wënsch vum Patient ugepasst.

Den Dokter informéiert Iech iwwert déi beschte Behandlung
an och iwwer d'Virdeeler an d'Nodeeler: zesummen entscheet
Dir iwwer Är Behandlung.

D'HEELUNG AN D'IWWERLIEWEN

Soulaang wéi den Tumeur d'Grenze vun der Prostata net
iwwerschratt huet an nach net verbreet ass (Metastasen),
sinn d'Chancen op eng Heelung ganz héich. Kombinié-
ert mat de richtege Behandlungen, erlaabt déi fréizäiteg
Erkennung eng Heelungschance a méi wéi 9 vun 10 Fäll.

GUTT ZE WËSSEN

Betreffend dem Prostatt-Kriibs sollte verschidden Unzeechen Iech alarméieren. Obwuel dës Symptomer harmlos erschéngen, sollten dës net iwwersi ginn.

Wann Dir Zweifel hutt, schwätzt mat Ärem Dokter, deen Iech entspreichend Ärer Situatioun berode kann.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale
Direction de la santé

Centre de coordination des programmes de dépistages organisés des cancers
20, rue de Bitbourg | L-1273 Luxembourg
Tél. +352 247-75550 | depistage.cancer@ms.etat.lu | www.sante.lu

ISBN 978-2-49676-034-7