



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

La santé affective et sexuelle des résident·es au Luxembourg

Direction de la santé

30 Juin 2026





CONTEXTE

- Le Luxembourg engagé dans des traités portant sur les droits en santé sexuelle
- Cadre du Plan National d'Action Santé Affective et Sexuelle
- En cohérence avec la politique commune de promotion de la santé affective et sexuelle, signée en juin 2024 par les 4 ministères : M3S, MENEJ, MEGA, MFSVA
- Une demande des partenaires de terrain
- Des enquêtes existantes ou concomitantes au Luxembourg
 - Enquête sur la sécurité du STATEC 2019/2020
 - Etude HBSC 2022 enfants et les adolescents (13-18 ans)
 - Etude LiLi « Enquête sur les violences et discriminations LGBTIQ+ au Luxembourg » réalisée par Cigale, de juin 2024 à mai 2025



OBJECTIFS

➤ Les finalités de cette étude sont :

- Avoir une estimation des prévalences des problématiques rencontrées, en termes de santé affective et sexuelle
- Mieux connaître les représentations, les besoins et les comportements des résidents du Luxembourg pour pouvoir agir
- Pouvoir identifier des actions à mettre en œuvre pour permettre aux résidents du Luxembourg de mieux vivre leur santé affective et sexuelle, en toute sécurité
- Pouvoir identifier les groupes de population nécessitant des actions adaptées à leurs caractéristiques ou situations



METHODE

- Enquête transversale à partir du panel ILRES, pseudonymisée
- Questionnaire élaboré avec les retours des partenaires : CESAS, Planning, CIGALE
- 2 371 résident·es de 18 ans et plus du Luxembourg
- Echantillon représentatif de la population des résident·es du Luxembourg sur : âge, sexe, nationalité, région de résidence et activité professionnelle
- Recueil du Computer Assister Web Interview (CAWI) du 29 Janvier au 27 Février 2025
- Données socio- démographiques : âge, sexe, statut conjugal, situation de cohabitation, occupation, niveau d'éducation, zone géographique, pays de naissance et revenu

METHODE



- 6 domaines abordés :
 - Les perceptions, jugements ressentis et représentations sur **l'identité de genre, l'orientation sexuelle et l'attirance sexuelle** ;
 - Les **premiers rapports sexuels** : âge, vécu, consentement et motivations ;
 - La connaissance et les comportements concernant la **prévention et le dépistage des IST** (Infections Sexuellement Transmissibles) à trois moments de la vie : lors du premier rapport, au cours de la vie et dans les 12 derniers mois ;
 - La connaissance et les comportements concernant la **contraception, la contraception d'urgence et l'IVG** (Interruption Volontaire de Grossesse) lors du premier rapport et dans les 12 derniers mois ;
 - Les comportements concernant le **consentement et les violences sexuelles** ;
 - Les séances **d'éducation à la santé** dont ont bénéficié les résidents, les attentes couvertes et non couvertes, et les sources d'information utilisées.



METHODE

- Les résultats présentés sont issus de l'analyse de la Direction de la santé à partir des données brutes recueillies par ILRES
- Définitions
 - Premier rapport précoce : ≤ 14 ans
 - Premier enfant précoce : < 20 ans
 - Personne en situation de handicap : statut reconnu administrativement
- Pour faciliter l'appropriation les résultats principaux sont présentés arrondis
- Du fait du caractère sensible des sujets abordés, il a été donné en fin de questionnaire des informations sur à qui s'adresser en cas de besoin



METHODE

POINT D'ATTENTION :

Ne pas surinterpréter les résultats de cette enquête, surtout en termes de causalité. Elle permet surtout :

- De repérer des problématiques à traiter
- D'identifier des besoins en termes d'information, de sensibilisation, d'accès à des prises en charge
- D'identifier des problématiques pour lesquelles il est nécessaire de mieux explorer les déterminants, pour mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir agir



RÉSULTATS PRINCIPAUX





Description de la population à l'étude





Sexe

Masculin	50,1%
Féminin	49,9%
Autre	0%

Age

18 – 24 ans	9,7%
25 – 34 ans	19,4%
35 – 44 ans	19,2%
45 – 54 ans	17,5%
55 – 64 ans	15,7%
≥ 65 ans	18,5%

Enceinte	2,2%
Ont un enfant	60,9%
Handicap	3,6%
Premier rapport précoce	6,7%
Premier enfant précoce	8,3%

Statut conjugal (*une seule réponse*)

Célibataire	19,0%
En couple	18,9%
Marié.e	42,6%
PACSé.e	7,6%
Divorcé.e / séparé.e	8,6%
Autre	3,2%

Cohabitation (*choix multiple*)

Seul.e	20,7%
Avec mon·ma·mes partenaire·s	63,2%
Avec au moins un de mes parents	11,5%
En colocation	3,2%
Autre	2,2%


Répartition de la population d'étude par zone géographique




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

Canton



Commune



Niveau d'éducation le plus élevé

Fondamental	2,6%
Ecole spécialisée (réalisation enseignement obligatoire)	1,1%
1 ^{er} cycle du secondaire	7,0%
2 nd cycle du secondaire	33,0%
Post- secondaire non supérieur (Brevet de Maîtrise)	3,3%
Supérieur (bac +2)	11,1%
Licence ou équivalent	15,0%
Master ou équivalent	22,2%
Doctorat	3,0%
Autre	1,7%

Occupation principale

Indépendant·e	4,6%
Cadre supérieur / profession libérale	8,9%
Cadre moyen / salarié·e	43,7%
Sans travail, à la recherche d'un emploi	2,9%
Femme- Homme au foyer	3,6%
Étudiant·e- écolier·ère	9,3%
Retraité·e	24,0%
Autre	3,2%





Identité de genre, orientation et attirance sexuelle

Au maximum, 0,2% (n=5) n'ont pas souhaité
répondre à une des questions sur le sujet





Identité de genre et orientation sexuelle

1% se définissent autrement que comme homme, femme ou cisgenre

Pas de différence chez ceux ayant eu un premier rapport précoce, un premier enfant précoce, ou en situation de handicap

4% chez les jeunes de 18-24 ans

11% ont une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle

Pas de différence chez ceux ayant eu un premier enfant précoce

17% chez les jeunes de 18-24 ans

33% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

21% chez les personnes en situation de handicap

9% des hommes ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH)



Remarques, questions ou jugement négatif

12% de la population des résidents a eu des remarques, questions ou jugements négatifs sur leur genre, leur orientation ou attirance sexuelle


Pas de différence chez les 18-24 ans

21 % chez les 25-34 ans

23% chez ceux ayant un premier enfant précoce

34% chez les personnes en situation de handicap

38% chez ayant eu un premier rapport précoce



Niveau de
jugement perçu

Remarques, questions ou jugement négatif par origine et populations



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

<i>(choix multiple)</i>	Tous	Rapport précoce	Enfant précoce	Handicap	25-34 ans
Par entourage familial	6%	20%	10%	18%	9%
Par entourage d'amis	5%	12%	7%	16%	9%
Par entourage professionnel	3%	20%	2%	7%	5%
Par environnement sport, loisir, culture	3%	7%	4%	10%	4%
Par voisinage	2%	12%	1%	9%	3%
Par professionnel de santé	1%	9%	1%	6%	3%
NON (pas eu de remarque ou jugement)	88%	62%	77%	66%	79%



Premiers rapports sexuels



Dans **8%** des cas le premier rapport est avec une personne du même sexe

6% hommes, **2%** femmes

7% ont eu un premier rapport précoce (≤ 14 ans).

Pas de différence homme/femme

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans, chez les personnes ayant eu un premier enfant précoce ou en situation de handicap

Dans **85%** des cas le premier rapport était désiré et consenti y compris chez les jeunes

92% chez les hommes et **77%** chez les femmes

Pour **10%** des cas, le premier rapport était accepté (sans pression du partenaire) mais non vraiment souhaité, y compris chez les jeunes


4% chez les hommes et **16%** chez les femmes



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

**65% des résidents ont eu leur
premier rapport sexuel à 18
ans ou avant**



Entre 16 et 18 ans
49%

Raison principale du premier rapport par populations



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

<i>(une seule réponse)</i>	Tous	18-24 ans	Enfant précoce	Rapport précoce	Handicap
L'amour, la tendresse	39%	47%	32%	15%	31%
Le désir	29%	24%	21%	35%	28%
Franchir une étape (« se sentir adulte, reconnu »)	12%	8%	15%	8%	10%
La curiosité	8%	7%	10%	24%	10%
Pour faire plaisir à mon·ma partenaire	4%	7%	7%	3%	5%
Pour faire comme vos amis/copains	1%	1%	1%	1%	4%



Prévention et dépistage des IST





Au cours du premier rapport : protection contre IST

53% ont utilisé une méthode pour se protéger des IST lors du premier rapport

Pas de différence hommes/femmes

Pas de différence chez ceux ayant eu un premier rapport précoce ni chez les personnes en situation de handicap

75% chez les jeunes de 18-24 ans

31% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

Utilisation d'une méthode lors du premier rapport pour éviter une IST, par sexe et groupes d'âge

Population de 2266 résidents ayant déjà eu des rapports sexuels


Q026 Avez-vous, vous ou votre partenaire, utilisé une méthode ou un moyen pour éviter une IST (infection sexuellement transmissible) lors de ce premier rapport ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

C'est aux âges les plus élevés que la part des individus n'ayant pas utilisé de méthode pour éviter une IST est la plus élevée, tant chez les hommes que chez les femmes.



Au cours de la vie : prévalences des IST



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

16% des personnes ont eu au moins une IST

12% une fois, 4% plusieurs fois

9% chez les jeunes de 18-24 ans

7% une fois, 2% plusieurs fois

35% chez les personnes en situation de handicap


14% une fois, 21% plusieurs fois

45% chez les personnes ayant eu un premier rapport
précoce

36% une fois, 9% plusieurs fois

28% chez les personnes ayant eu un premier enfant
précoce

18% une fois, 10% plusieurs fois



Au cours de la vie : tests de dépistage



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé


56% ont réalisé un ou plusieurs tests de dépistage des IST

Pas de différence

- Entre homme et femme
- chez les personnes ayant eu un premier enfant précoce
- Chez les personnes en situation de handicap

34% chez les jeunes de 18-24 ans

70% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce






Au cours des 12 derniers mois : nombre de partenaires


Nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois	Tous	Rapport précoce	Enfant précoce	Handicap	18-24 ans
0	17%	4%	10%	26%	15%
1	72%	56%	83%	51%	71%
2	6%	12%	3%	5%	8%
3 ou plus	6%	27%	4%	18%	6%

Nombre de partenaires
nouveaux au cours des 12
derniers mois





Au cours des 12 derniers mois : partenaires rencontrés sur internet/applis



Au cours des 12 derniers mois : protection contre les IST



28% ont utilisé un moyen de protections contre les IST

33% chez les hommes et 23% chez les femmes

16% avec chaque partenaire, 12% parfois mais pas tout le temps

63% chez les jeunes de 18-24 ans

39% avec chaque partenaire, 24% parfois mais pas tout le temps

49% chez les personnes en situation de handicap

18% avec chaque partenaire, 31% parfois mais pas tout le temps


43% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

20% avec chaque partenaire, 23% parfois mais pas tout le temps



Au cours des 12 derniers mois : raison pour ne pas utiliser de protection contre les IST (Choix multiple)

Jeunes 18-24 ans





Au cours des 12 derniers mois : test de dépistage

31% des personnes ont réalisé un test de dépistage

22% un seul test, **9%** plusieurs tests

Pas de différence chez les personnes en situation de handicap


42% chez les jeunes de 18-24 ans

31% un seul test, **11%** plusieurs tests

49% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

24% un seul test, **25%** plusieurs tests

Discussion des résultats avec le(s) partenaire(s)



Pas de différence entre les
populations

Sentiment d'être informé sur les IST



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale


Direction de la santé

85% des personnes se sentent informées
sur les IST

pas de différence homme /
femme, ni chez ceux ayant eu un
premier rapport précoce, ni chez les
personnes en situation de handicap

75% chez les 18-24 ans

76% chez les personnes ayant eu
un premier enfant précoce





...mais certaines connaissances ne semblent pas claires

- Possibilité de contracter une IST en se faisant faire un piercing/un tatouage
 - 42% d'accord, 45% pas d'accord et 16% ne savent pas
 - 36% d'accord, 47% pas d'accord et 17% ne savent pas chez les jeunes de 18-24 ans
- Possibilité de contracter une IST en ayant des rapports sexuels protégés (avec préservatif) avec une personne ayant une IST
 - 22% d'accord, 68% pas d'accord et 10% ne savent pas
 - pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans
- Possibilité de contracter une IST en buvant dans le verre d'une personne séropositive (ayant le VIH)
 - 14% d'accord, 75% pas d'accord et 11% ne savent pas
 - pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans



Contraception, contraception d'urgence et IVG





Au cours du premier rapport : protection contre la grossesse

68% ont utilisé une méthode de contraception pour se protéger des grossesses lors du premier rapport

Pas de différence entre les hommes et les femmes


79% chez les 18-24 ans

34% chez ceux ayant eu un premier rapport précoce

52% chez les personnes en situation de handicap

Utilisation d'une méthode lors du premier rapport pour éviter une grossesse, par sexe et groupes d'âge

Population de 2266 résidents ayant déjà eu des rapports sexuels
Q027 Avez-vous, vous ou votre partenaire, utilisé une méthode ou un moyen pour éviter une grossesse lors de ce premier rapport ?



Au cours de la vie : utilisation de la contraception d'urgence



33% des personnes ont utilisé la contraception d'urgence au cours de leur vie

21% une fois, **12%** plusieurs fois

Pas de différence chez les personnes en situation de handicap

44% chez les jeunes de 18-24 ans

24% une fois, **20%** plusieurs fois

51% chez les personnes ayant eu un premier enfant précoce

23% une fois, **28%** plusieurs fois

47% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

28% une fois, **19%** plusieurs fois

Contraception d'urgence (pilule du lendemain) par groupes d'âge


Population de 1138 femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels ou subi un viol

Q058 Avez-vous déjà utilisé la contraception d'urgence (pilule du lendemain) ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé





Au cours des 12 derniers mois : protection contre la grossesse

58% des personnes ont utilisé une méthode de contraception au cours de 12 derniers mois

pas de différence chez les personnes en situation de handicap, ni entre hommes et femmes

70% chez les personnes ayant eu un enfant précoce

74% chez les personnes ayant eu un rapport précoce

78% chez les jeunes de 18-24 ans

Méthode(s) de contraception et satisfaction


Population de 1331 résidents utilisent une méthode de contraception
Q070 Etes-vous d'accord avec l'affirmation suivante ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

« Actuellement, ma méthode/mon moyen
de contraception me satisfait pleinement »




59%


30%

8%

3%



Satisfait de la méthode



IVG : prévalences



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

17% des femmes ont eu une IVG

12% une fois, 5% plusieurs fois

8% des jeunes de 18-24 ans ont eu une IVG

6% une fois, 2% plusieurs fois

25% des femmes ayant un premier rapport précoce ont eu une IVG

12% une fois, 13% plusieurs fois

33% des femmes en situation de handicap ont eu une IVG

8% une fois, 25% plusieurs fois


Interruption volontaire de grossesse, par groupes d'âge

Population de 1138 femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels ou subi un viol
Q060 Avez-vous déjà eu recours à l'interruption volontaire de grossesse (un avortement) au cours de votre vie ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé



51% au Luxembourg et 56% à l'étranger

94% au Luxembourg, 6% à l'étranger chez les femmes de 18-24 ans

19% au Luxembourg, 81% à l'étranger chez femmes ayant eu un premier rapport précoce

67% au Luxembourg, 33% à l'étranger chez les femmes en situation de handicap

71% au Luxembourg, 32% à l'étranger chez les femmes nées au Luxembourg

Points d'attention :

Les personnes ayant eu plusieurs IVG pouvaient avoir eu recours à des IVG dans plusieurs pays

Dépénalisation de l'IVG en 2014 → Impact sur les générations âgées de 35 ans et au delà

Interruption volontaire de grossesse par lieu de l'intervention


Population 173 résidents ont déjà eu recours à l'IVG

Q061 Lieu de l'IVG. Était-ce... ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé



Sentiment d'être informé sur contraception



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé


92% des personnes se sentent informées
sur la contraception

pas de différence homme /
femme, ni chez ceux ayant eu un
premier rapport précoce

88% chez les 18-24 ans

85% chez les personnes ayant eu
un premier enfant précoce

78% chez les personnes en
situation de handicap





...mais certaines connaissances ne semblent pas claires

- 62% des personnes connaissent la gratuité de la contraception
 - Pas de différence homme/femme, ni chez ayant eu un premier rapport précoce ou en situation de handicap
 - 53% chez les jeunes de 18-24 ans
- 35% des personnes connaissent la façon d'en bénéficier
 - pas de différence ni chez les jeunes, ni chez ayant eu un premier rapport précoce, ni chez les personnes en situation de handicap
 - 28% chez les hommes et 42% chez les femmes
- 47% des personnes connaissent la possibilité d'obtenir des préservatifs gratuitement auprès d'associations
 - Aucune différence dans les différentes populations
- 64% connaissent la façon de se procurer la contraception d'urgence
 - 81% chez les jeunes de 18-24 ans
 - Pas de différence dans les autres populations



Consentement et violences sexuelles





Question du consentement déjà abordée avec un·e ou des partenaires

53% des personnes ont abordé au moins une fois la question du consentement

57% pour les hommes et 49% pour les femmes

70% chez les jeunes de 18-24 ans

67% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

66% chez les personnes en situation de handicap



Pression d'un.e partenaire pour avoir un rapport sexuel

34% des personnes ont ressenti au moins une fois dans leur vie une pression d'un.e partenaire pour avoir un rapport sexuel

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans

18% chez les hommes et 50% chez les femmes

53% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

54% chez les personnes en situation de handicap

Remarques dévalorisantes sur le fait que la personne n'avait pas envie d'avoir des rapports sexuels



34% des personnes ont eu un·e partenaire ayant fait des remarques dévalorisantes sur le fait que la personne n'avait pas envie d'avoir des rapports sexuels

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans

23% chez les hommes et **46%** chez les femmes

51% chez les personnes en situation de handicap

43% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

Déjà eu des rapports sexuels (sans pression de leur partenaire), alors que la personne n'en avait pas vraiment envie



53% des personnes ont déjà eu des rapports sexuels (sans pression de leur partenaire), alors qu'elle n'en avait pas vraiment envie

36% chez les hommes et **69%** chez les femmes

47% chez les jeunes de 18-24 ans

47% chez les personnes en situation de handicap

66% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce



Déjà souhaité arrêter un acte sexuel, mais n'ont pas osé l'exprimer

26% des personnes déjà souhaité arrêter un acte sexuel, mais n'ont pas osé l'exprimer

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans, ni chez les personnes en situation de handicap

15% chez les hommes et **37%** chez les femmes

48% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

Réaliser des actes sexuels que les personnes n'avaient pas envisagés ou désirés, en raison de la pression de leur partenaire, ou pris par surprise



31% des personnes se sont senties poussé·es à réaliser des actes sexuels qu'elles n'avaient pas envisagés ou désirés, en raison de la pression de votre partenaire ou pris par surprise

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans

17% chez les hommes et **45%** chez les femmes

42% chez les personnes en situation de handicap

47% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

Rapport sexuel non protégé imposé malgré leur désaccord



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale
Direction de la santé

9% des personnes ont déjà eu un rapport sexuel non protégé imposé malgré leur désaccord

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans

6% chez les hommes et 12% chez les femmes

25% chez les personnes en situation de handicap

30% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce



Poursuite d'un rapport sexuel malgré la demande d'arrêter

13% des personnes ont subi la poursuite d'un rapport sexuel malgré le fait qu'elles aient demandé d'arrêter

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans

7% chez les hommes et **20%** chez les femmes

34% chez les personnes en situation de handicap

24% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce



Viols déclarés : prévalences

8% des personnes ont subi un viol

Pas de différence chez les jeunes de 18-24 ans

4% chez les hommes et 12% chez les femmes

25% chez les personnes en situation de handicap

35% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce



Auteur du viol (choix multiple)

37% des cas une personne connue

25% des cas un membre de la famille

18% des cas un.e conjoint.e ou partenaire, ami.e, copain.copine

16% des cas un.e ex conjoint.e ou ex partenaire, ex ami.e, ex copain.copine

6% des cas un représentant de l'autorité (juridique, religieuse, éducative, etc.)

5% des cas une personne de l'entourage professionnel

14% des cas un.e inconnu.e



En parler

60% des personnes en ont parlé à quelqu'un

Pas de différence entre les hommes et les femmes

71% chez les jeunes de 18-24 ans

73% chez les personnes en situation de handicap

59% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce



Porter plainte

15% des personnes ont porté plainte

Pas de différence chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

24% chez les hommes et 11% chez les femmes

10% chez les jeunes de 18-24 ans

66% chez les personnes en situation de handicap

Relation entre parler du viol à quelqu'un et porter plainte



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé

En Parler	Porter plainte	
	Non	Oui
Non	65	3 (4%)
Oui	86	20 (19%)

les personnes ayant parlé du viol sont environ quatre fois plus nombreuses à avoir porté plainte



Education pour la santé



44% ont bénéficié de cours en santé affective et sexuelle

Pas de différence chez les personnes en situation de handicap

69% chez les jeunes de 18-24 ans


51% chez les personnes ayant eu un premier rapport précoce

Ont bénéficié de cours d'éducation à la santé affective et sexuelle

	Tous	18-24 ans	Rapport précoce
Une seule fois	28%	21%	19%
Entre 2 et 4 fois	59%	69%	66%
5 fois et plus	14%	10%	16%

Les connaissances actuelles versus les besoins

Population de 1043 résidents ayant bénéficié de cours d'éducation à la SAS
Q032 Quels sujets ont été abordés dans ces cours d'éducation à la santé affective et sexuelle ?
Q034 Parmi les sujets non abordés dans ces cours, pour lesquels auriez-vous eu besoin d'être mieux informé-e ?



Sentiment d'avoir eu, dans ces cours, des réponses aux questions qu'on se posait

Population de 1043 résidents ayant bénéficié de cours d'éducation à la SAS

Q033 Dans vos souvenirs, à quel point ces cours ont-ils répondu aux questions que vous vous posiez (quel que soit le sujet), sur une échelle de 0 (aucune réponse aux questions que vous vous posiez) à 10 (toutes les réponses aux questions que vous vous posiez) ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale


Direction de la santé

49% des personnes ont noté moyen ou faible (score $\leq 5/10$) le niveau de réponse apportée aux questions que les personnes se posaient

pas de différence chez les personnes en situation de handicap

38% chez les jeunes 18-24 ans

40% chez les personnes SAS ayant eu un premier rapport précoce



Sources d'informations sur la santé affective et sexuelle par sexe


Population de 2371 résidents de 18 ans et plus

Q037 Parmi les sources d'informations suivantes, quelles sont **les 4 principales que vous utilisez** pour avoir des réponses à vos questions en termes de santé affective et sexuelle ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé



Déclarations de satisfaction de la vie sexuelle et de la vie de couple

Population de 2371 résidents de 18 ans et plus


Q073 Sur les 12 derniers mois, décririez-vous votre vie sexuelle comme étant ... ?

Q074 Sur les 12 derniers mois, décririez-vous votre vie de couple comme étant ... ?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé





MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Medecine-preventive@ms.etat.lu