





Décès au Luxembourg - 2022

Au Luxembourg, la déclaration des causes de décès survenus sur le territoire national (décès de fait) est obligatoire et se fait au moyen d'un certificat de décès. Le Registre des causes de décès encode les données présentes sur ce certificat. Les causes de décès sont codées selon la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) développée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une fois la base de données annuelle complétée, un protocole standardisé répondant aux exigences nationales et internationales de contrôle-qualité est effectué avant sa validation définitive. Cette fact sheet présente les chiffres clés des décès au Luxembourg en 2022, se rapportant à la cause primaire ou initiale des décès, selon la définition de l'OMS.


En bref...

En 2022, **4.283 décès** (50,3% d'hommes et 49,7% de femmes) dont **130 décès de non-résidents** sont survenus sur le territoire luxembourgeois, soit 1,3% de moins par rapport à 2021. **Le nombre de mortinaissances** (décès d'un bébé avant ou au cours de l'accouchement) **est de 71** et n'est pas inclus dans les statistiques de décès ci-après (voir mortalité foeto-infantile pour plus de détails). **Le lieu de décès enregistré est majoritairement l'hôpital**, suivi des maisons de retraites, des domiciles privés et d'autres lieux. L'âge moyen de décès est de **78 ans** (74 ans chez les hommes et 82 ans chez les femmes). **93,9% de tous les décès sont dus à des maladies** et 6,1% sont attribuables à des causes externes (accidents, suicides et autres). C'est en décembre 2022 que le nombre de décès enregistré est le plus élevé (402 décès soit 9,4%) par opposition au mois de septembre qui en compte le moins (318 décès soit 7,4%).



Mortalité foeto-infantile


Le graphique ci-dessous représente l'évolution des différents indicateurs de mortalité foeto-infantile (mortinatalité et mortalité des enfants de 0 à moins de 1 an) de 1967 à 2022. Sont exclus pour le calcul de ces taux de mortalité les décès de non-résidents et, depuis 1998, les mortinaissances dont le poids à la naissance est inférieur à 500 g et dont la durée de gestation est inférieure à 22 semaines.



Principales causes de décès

En 2022, les maladies de l'appareil circulatoire sont la **1^{ère} cause de mortalité au Luxembourg (1.104 décès)**, devant les tumeurs (1.099 décès). La COVID-19 qui était la 3^{ème} cause de mortalité en 2020 et 2021 a diminué considérablement en 2022 et se trouve à la 6^{ème} position avec 225 décès, soit 5,3% de tous les décès.

Les maladies de l'appareil circulatoire en cause sont principalement l'insuffisance cardiaque (192 décès), les cardiopathies ischémiques chroniques (127 décès) et l'infarctus aigu du myocarde (118 décès). La première cause de décès par tumeurs est le cancer du poumon chez l'homme (109 décès) et le cancer du sein chez la femme (105 décès).






Décès au Luxembourg - 2022

Evolution des causes de décès de 1998 à 2022

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des 6 principales causes de mortalité, de 1998 à 2022. Les décès de non-résidents sont exclus pour le calcul des taux bruts de mortalité.

Sur la période 1998-2022, on observe une diminution statistiquement significative de toutes les causes représentées dans le graphique à l'exception des troubles mentaux. On remarque aussi que la COVID-19 a diminué considérablement de 2021 à 2022.



Mortalité évitable


L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) ont établi en 2019 une liste commune de causes de décès évitables par prévention et par traitement chez les personnes décédant avant l'âge de 75 ans¹.

La mortalité évitable par prévention regroupe les causes de décès pouvant être évitées par des interventions de santé publique et de prévention primaire efficaces. La mortalité évitable par traitement regroupe les causes de décès pouvant être évitées par des soins de santé efficaces et prodigués à temps.

Selon le rapport « Panorama de la santé 2023 » publié par l'OCDE, le Luxembourg affiche de bonnes performances, avec le 9^{ième} meilleur (faible) taux de mortalité évitable par prévention avec 104 décès/100.000 habitants (moyenne OCDE : 158 décès/100.000 habitants) ; le taux de mortalité évitable par traitement (43

décès/100.000 habitants) se situe au 2nd rang (moyenne OCDE : 79/100.000 habitants)².


Les graphiques ci-dessous montrent, pour les 4 premiers groupes de causes, le nombre de décès qui auraient pu être évités au Luxembourg, de 1998 à 2022, respectivement par prévention (partie supérieure) et par traitement (partie inférieure). En 2022, 603 décès auraient pu être évités au Luxembourg par prévention, et 285 par traitement.



Mortalité par canton de résidence

L'analyse des taux bruts de mortalité par canton de résidence montre que, par rapport au taux national brut de mortalité (636 décès/100.000 habitants, décès de non-résidents exclus) :

- Les cantons de Vianden, Diekirch, Echternach, Clervaux et Esch-sur-Alzette présentent des taux bruts de mortalité significativement supérieurs au taux national brut de mortalité (avec respectivement 1.080, 783, 775, 756 et 682 décès/100.000 habitants).
- À l'inverse, le canton de Luxembourg présente un taux brut de mortalité significativement inférieur au taux national brut de mortalité (avec 512 décès/100.000 habitants).



¹ Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (January 2022 version)

² OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en>