



NOS FIZEMOS O TESTE!

Teste de rastreio do VIH:
Respostas a todas as suas perguntas!

As perguntas são coloridas de acordo com o tema abordado

PERGUNTAS GERAIS

PERGUNTAS SOBRE AS RELAÇÕES SEXUAIS

PERGUNTAS SOBRE AS DROGUAS

PERGUNTAS SOBRE O TESTE DE RASTREIO

Editor: HIVberodung Croix-Rouge/www.sida.lu

Ministère de la Santé/ www.sante.lu

Edição 2015

ISBN 978-99959-41-06-2





A infecção pelo vírus VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana – diminui as defesas imunitárias do sistema imunológico, o que favorece o aparecimento de doenças que podem ser muito graves. Anualmente no Luxemburgo, surgem cerca de 100 casos de pessoas com depistagem positiva a esta infecção sendo portanto, é necessário criar um acompanhamento médico.

Este acompanhamento permite que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e, sobretudo, impede o aparecimento de doenças oportunistas.

O Comité National de Vigilância da SIDA estima que vivem no Luxemburgo entre 300 e 400 pessoas com VIH sem o saberem! Isto não só compromete as suas próprias vidas, como aumenta o risco de transmissão deste vírus! O único meio de saber se uma pessoa é portadora deste vírus é através de um teste de rastreio.

O QUE É O TESTE DE RASTREIO DO VIH?

O teste de rastreio é um meio simples, seguro e eficaz de detecção de uma infecção pelo VIH. Este teste, efetuado através de uma análise de sangue, detecta a presença de anticorpos ao VIH no sangue. Estes anticorpos são produzidos pelo organismo entre duas a doze semanas após a infecção pelo VIH!

Um resultado negativo no teste de rastreio só é totalmente fiável passadas 12 semanas após a situação de risco, e se você não viveu uma situação de risco durante esse período e utilizou um preservativo durante essas 12 semanas!

SEROPOSITIVO, SERONEGATIVO: O QUE É QUE ISTO SIGNIFICA EXACTAMENTE?



Se o resultado do teste for “**positivo**”, isto significa que o teste detectou a presença de anticorpos do VIH. A pessoa é seropositiva e portadora do VIH. É muito importante que consulte imediatamente um médico especialista para ter acompanhamento médico e, se necessário, começar um tratamento antiretroviral. Atualmente, preservando a sua saúde pode viver muito tempo com VIH.

Um resultado “**indeterminado**” ou “parcialmente positivo” pode ser devido à existência de outra doença ou a uma exposição mais recente ao VIH. Sendo assim é necessário falar com um médico e fazer novo teste para o VIH.

Se o resultado for “**negativo**” num teste realizado 12 semanas (ou mais) depois da situação de risco, tem-se a certeza de que o VIH não foi contraído nesse período. Um resultado “negativo” significa que o teste não detectou anticorpos VIH, em outras palavras, não houve infecção. A pessoa é **seronegativa**.

Os testes com resultados indeterminados ou positivos devem ser repetidos numa segunda amostra de sangue para se ter a certeza de que não houve nenhum erro de rotulagem ou de manipulação. Só depois de feito este segundo teste é que se pode dizer a um paciente se ele é portador do vírus VIH ou não.

QUEM DEVE SE SUBMETER A UM TESTE DE RASTREIO?



Qualquer pessoa que passou, pelo menos uma vez na vida, por uma exposição potencial ao VIH. Uma exposição ao vírus engloba todas as situações em que um líquido susceptível de conter o vírus (sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno) entra em contacto com uma entrada

do corpo (ferida aberta e/ou mucosa: vaginal, anal, oral, nasal, ocular e glândula do pénis).

QUANDO SE DEVE FAZER UM TESTE DE RASTREIO?

12 semanas após a situação de risco. Só a partir deste prazo é que o resultado de um teste de rastreio é fiável a 100% pois este é o tempo necessário para o organismo produzir anticorpos contra o vírus, depois de infecção pelo VIH.

Ao fim de 12 semanas, o resultado de um teste do VIH é fiável: um resultado “negativo” significa que o teste não detectou anticorpos, , em outras palavras, não houve infecção. Ao contrário, um resultado “positivo” significa que o teste detectou anticorpos ao VIH e que houve infecção pelo VIH.

Um teste efectuado antes das 12 semanas, pode ser demasiado prematuro: um resultado negativo poderá vir a ser positivo na análise seguinte. A fiabilidade do resultado ao fim de quatro semanas já é da ordem dos 85%, mas o resultado só pode ser fiável a 100% ao fim de 12 semanas.

72 horas após a situação de risco: no prazo de 72 horas, pode-se, com o acordo de um médico, fazer um tratamento de urgência chamado PEP (Post Exposition Prophylaxie - Profilaxia após a Exposição). Isto permitir-lhe-á também comprovar (ou não) uma seronegatividade antes da exposição ao risco. Neste caso, é necessário repetir o teste ao fim de quatro semanas e de doze semanas.

IMPORTANTE! É durante a seroconversão (período entre 15 dias e 12 semanas após a contaminação) que o risco de transmissão do VIH é mais alto.

TIVE UMA RELAÇÃO NÃO PROTEGIDA HÁ 2-3 SEMANAS E, AO FIM DE ALGUNS DIAS, TIVE FEBRE, DOR DE GARGANTA E MANCHAS VERMELHAS NA PELE; DEVO FAZER UM TESTE DO VIH?

SIM! A maior parte das pessoas tem sintomas tais como febre, dores de garganta e manchas vermelhas na pele durante a fase de seroconversão (quando o organismo começa a fabricar defesas contra o VIH). Um teste de pesquisa de antígenos poderá apresentar um resultado positivo nessa altura. **CUIDADO! É durante este período de seroconversão que o risco de transmissão é mais elevado!** Portanto, é essencial utilizar o preservativo enquanto não tiver o resultado do teste. Se o resultado for negativo, deve-se fazer um segundo teste 12 semanas após a situação de risco para se obter um resultado fiável a 100%.

SOU SOLTEIRO E TENHO FREQUENTEMENTE AVENTURAS PASSAGEIRAS: DEVO FAZER UM TESTE?

Se não utiliza preservativo quando tem relações sexuais com parceiros diferentes, é recomendável fazer um teste de despistagem de 3 em 3 meses.

Mas, se usar sempre o preservativo, bastará fazer um teste de rastreio anual.



—
**LISTA DE CENTROS
DE TESTE DE RASTREIO
NA PÁGINA 19**
—

VIVO COM O MEU COMPANHEIRO (A MINHA COMPANHEIRA) HÁ VÁRIOS ANOS E SOMOS FIÉIS, QUE INTERESSE TEMOS EM FAZER UM TESTE DE RASTREIO?

Fazer um teste de rastreio dá-vos informação sobre a vossa situação serológica. Se nunca fizeram nenhum teste ao VIH, aconselhamos a fazê-lo.

A infecção por VIH pode não mostrar quaisquer sintomas durante vários anos. É por isso que é importante fazer o teste mesmo quando se vive numa relação de amor fiel!

TIVE UMA RELAÇÃO SEXUAL NÃO PROTEGIDA COM UM NOVO PARCEIRO QUE APARENTAVA ESTAR BEM DE SAÚDE, DEVO MESMO ASSIM FAZER UM TESTE?

CLARO! A infecção por VIH não apresenta sintomas particulares e há muitas pessoas seropositivas que não sabem que o são e não fazem a despistagem, pois pensam estar bem de saúde. É importante fazer um teste de rastreio quando se teve uma relação não protegida. Mesmo que, em certos casos, os anticorpos anti-VIH sejam detectados ao fim de algumas semanas, só um teste feito 12 semanas após a relação de risco dá um resultado fiável a 100%, e si você não viveu uma situação de risco durante esse período e utilizou um preservativo durante essas 12 semanas!

SOU HOMOSSEXUAL E OUVI DIZER QUE DEVO FAZER TESTES COM REGULARIDADE SE TENHO PARCEIROS VARIADOS, É VERDADE?



ABSOLUTAMENTE! Infelizmente, há um grande número de pessoas seropositivas que não sabem que estão infectadas e o risco de infecção durante uma relação sexual entre dois homens sem preservativo é bastante grande. É importante utilizar o preservativo durante as relações anais bem como felação, sendo aconselhável fazer testes regulares, por exemplo, de 3 em 3 meses. Além disso, é importante fazer a depistagem de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) como gonorreia, clamídia, sífilis e hepatite C.

DUVIDO DA FIDELIDADE DA MINHA COMPANHEIRA (DO MEU COMPANHEIRO). UM TESTE É ÚTIL?

Um teste lhe dirá se o seu estatuto serológico é positivo ou negativo mas não prova uma infidelidade da sua parceira (do seu parceiro).

O MEU COMPANHEIRO (A MINHA COMPANHEIRA) CONFESSOU-ME TER TIDO UMA AVENTURA E FICAMOS COM DÚVIDAS SOBRE A NOSSA SAÚDE; QUE DEVEMOS FAZER?

Se o seu companheiro (a sua companheira) não usou proteção, é importante que os dois se submetam a um teste de rastreio 12 semanas após a situação de risco. Para também terem a certeza de que não contraíram outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). É também importante fazer uma despistagem, por exemplo, da clamídia, da gonorreia, da sífilis ou também da herpes. O melhor é pedir ao médico uma análise completa de deteção das IST.

A MINHA COMPANHEIRA (O MEU COMPANHEIRO) E EU ESTAMOS JUNTOS HÁ VÁRIOS MESES E UTILISAMOS PRESERVATIVO, O TESTE DE RASTREIO PERMITIR-NOS-Á RENUNCIAR AO PRESERVATIVO?

SIM! Desde que os resultados dos vossos testes sejam negativos e que se mantenham fiéis um ao outro. Não se esqueçam de que um teste só é fiável a 100% se não tiverem estado em situações de risco durante as 12 semanas que precederam os testes.



FUI VIOLADO(A) OU ABUSADO(A) SEXUALMENTE, DEVO FAZER O TESTE?

É INDISPENSÁVEL QUE FAÇA UM TESTE! Se a agressão sexual ou violação aconteceu há menos de 72 horas, deve impreterivelmente deslocar-se ao Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou a qualquer outro serviço de urgência hospitalar a fim de consultar um médico que lhe prescreverá um tratamento de urgência contra o VIH e que também lhe fará um teste de rastreio do VIH e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis. Este teste definirá a sua situação serológica no momento da agressão. Será necessário fazer novo teste 12 semanas após a agressão sexual ou a violação para saber se foi infectado(a) ou não.

Em caso de violação, não hesite em contactar os serviços de socorro (112) e a polícia (113) para receber informações e apoio necessários.

ACORDEI SEM ME LEMBRAR DE TODOS OS PORMENORES DA NOITE DE ONTEM...



Fazer um teste dar-lhe-á informações sobre o seu estatuto serológico mas será necessário esperar 12 semanas após essa noite para fazer novo teste a fim de saber se foi infectado(a) ou não.



ÀS VEZES, INALO COCAÍNA E OUVI DIZER QUE PODE HAVER RISCO DE TRANSMISSÃO. DEVO FAZER UM TESTE DE RASTREIO?

O risco de transmissão do VIH por inalação da cocaína ou de qualquer outra substância é mínimo, mas o risco é real no que se refere à transmissão do vírus da hepatite C se o canudinho for compartilhado.

JÁ ME INJETEI COM HEROÍNA, DEVO FAZER UM TESTE?

SIM. Sobretudo se utilizou a seringa de outra pessoa! Não se esqueça de que, além do VIH, o vírus da Hepatite C transmite-se muito facilmente pelo sangue e, portanto, quando há reutilização de seringas.

A hepatite C se detecta por um exame de sangue 12 semanas depois de uma contaminação. Se você utilizou material de uma outra pessoa para inalar ou injetar drogas, consulte o seu médico para que ele possa prescrever um teste de rastreio para a hepatite C. É também possível fazer um teste de rastreio rápido para a hepatite C no Dimps (ver os lugares e horários de passagem do DIMPS no www.sida.lu ou www.dimps.lu)



PIQUEI-ME INVOLUNTARIAMENTE COM UMA SERINGA USADA, O QUE DEVO FAZER?

Se se picou acidentalmente com uma seringa usada e se passaram menos de 72 horas, deve dirigir-se imediatamente ao Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou a qualquer outro serviço de urgência para receber um tratamento de urgência (a PEP).

Será feito um primeiro teste de VIH e o médico irá prescrever-lhe o tratamento de urgência que consiste em tomar 3 comprimidos duas vezes por dia durante um mês. Atenção! Quanto mais cedo for iniciado o tratamento após o acidente, maior será a sua eficácia! Se não pôde ir ao CHL ou a outro serviço de urgência nas 72 horas, deverá fazer um teste ao fim de 12 semanas para saber se está infectado ou não.

Se se passaram menos de 72 horas após a situação de risco, dirija-se o mais rapidamente possível a um serviço de urgências hospitalares a fim de se submeter a um tratamento de urgência (PEP).

ESTOU GRÁVIDA E O MEU GINECOLOGISTA PRESCREVEU-ME UM TESTE DE DESPISTAGEM, POR QUÊ?

O teste de despistagem durante a gravidez destina-se a proteger o bebé em caso de infecção da mãe pelo VIH. Atualmente, graças aos tratamentos retrovirais contra o VIH, a transmissão do vírus da mãe para o bebé pode ser evitada. Se a despistagem do vírus

VIH da mãe for positivo durante a gravidez, esta recebe um tratamento com o objetivo de reduzir a quantidade de vírus no seu sangue, o que diminui o risco de transmissão para o bebé. Depois de nascer, o bebé fará ainda um tratamento durante um mês, o que o protege dos vírus que entraram no seu corpo durante o parto. Graças a este tratamento, a transmissão de mãe para filho é praticamente inexistente no Luxemburgo.

As mães VIH+ não podem amamentar seus bebés, pois o leite materno também tem muitos vírus!



O PRESERVATIVO ROMPEU-SE E NÃO SEI SE O MEU PARCEIRO (A MINHA PARCEIRA) É OU NÃO POSITIVO(A); O QUE DEVO FAZER?



Se se passaram menos de 72 horas após a situação de risco (ruptura do preservativo), deve deslocar-se imediatamente ao Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou a qualquer outro serviço de urgência para consultar um médico que vai avaliar o risco de transmissão a fim de prescrever eventualmente um tratamento de urgência (a PEP). Será feito um primeiro teste de VIH e o médico prescreverá o tratamento de urgência que consiste em tomar 3 comprimidos duas vezes por dia durante um mês. Atenção! Quanto mais cedo for iniciado o tratamento após o acidente, maior será a sua eficácia! Se não pôde ir ao CHL ou a outro serviço de urgência no prazo de 72 horas, deverá fazer um teste ao fim de 12 semanas para saber se está infectado ou não.



A PEP não pode ser comparada com a pílula do dia seguinte e tem numerosos efeitos secundários! O tratamento de urgência não pode, em caso algum, substituir a utilização do preservativo!

SOU SERONEGATIVO(A), ISTO SIGNIFICA QUE ESTOU PROTEGIDO(A) CONTRA O VIH?

NÃO! Um teste negativo significa que não há anticorpos anti-VIH no sangue e, portanto, não há infecção.

Um resultado negativo não protege, em caso algum, contra uma infecção!

PODE-SE FAZER VÁRIOS TESTES POR ANO?

SIM! É perfeitamente recomendável fazer um teste de 3 em 3 meses se considerar que viveu várias situações de risco ao longo do ano. Mas para evitar o risco é preferível usar sistematicamente um preservativo.

É PRECISO ESTAR EM JEJUM PARA FAZER O TESTE DE RASTREIO?

NÃO, não é preciso estar em jejum para o teste de rastreio do VIH.





—
**LISTA DE CENTROS
DE TESTE DE RASTREIO
NA PÁGINA 19**
—

ONDE DEVO FAZER O MEU TESTE DE RASTREIO?

Teste “clássico”:

- Peça ao seu médico habitual para lhe passar uma prescrição e dirija-se a qualquer laboratório ou hospital do país.
- Num centro de despistagem anónimo e gratuito: CHL, ZITHA KLINIK, HK, CHEM, CHDN, LNS - as moradas e os horários estão no fim desta brochura.

O resultado ser-lhe-á comunicado alguns dias mais tarde. Os testes de rastreio de última geração permitem ter um resultado fiável 12 semanas após a última situação de risco.

Teste “rápido”, anónimo e gratuito

- HIVberodung Croix-Rouge
94, Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T: 2755 4500

Segundas e quartas das 17h às 19h

... E SE EU QUISER FICAR NO ANONIMATO?

Há 7 locais de testes anônimos e gratuitos:

No Luxemburgo :

- Centre Hospitalier (CHL)
Service des Maladies
Infectieuses (2^e andar)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
dias úteis das 7h às 15h
www.chl.lu
- Zitha Klinik
36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
dias úteis das 11h às 18h
www.zitha.lu
- Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
dias úteis das 7h às 19h
sábado: 7h às 10h
www.hkb.lu
- HIVberodung Croix-Rouge
(testes rápidos)
94 Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T: 2755 4500
Segundas e quartas-feiras das
17h às 19h
www.aids.lu
www.sida.lu

Em Esch/Alzette :

- Centre Hospitalier
Emile Mayrisch
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
dias úteis das 7h às 17h
www.chem.lu

Em Ettelbrück :

- Centre Hospitalier du
Nord - St Louis
120, Avenue Lucien Salentyng
L-9080 Ettelbrück
dias úteis das 10h às 14h
www.chdn.lu

Em Dudelange :

- LNS
(Laboratoire National de Santé)
1, Rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
dias úteis das 7h30 às 16h
www.lns.lu

Depois de tirado o sangue, ser-lhe-á dado um número com o qual poderá levantar o resultado dois ou três dias mais tarde. O resultado é-lhe transmitido oralmente e, como o teste é anónimo, não irá receber qualquer documento a atestar se é seronegativo ou positivo.

COMO SE FAZ UM TESTE DE RASTREIO?

O teste de rastreio consiste numa simples coleta de sangue, que é analisado em laboratório. Nos testes rápidos, tira-se uma gota de sangue da extremidade do dedo, que se mistura com um reagente.

Fazer um teste rápido significa que se obtém o resultado rapidamente depois da coleta do sangue, mas não significa que o teste seja fiável se for feito antes das 12 semanas após a situação de risco.

ONDE POSSO FAZER UM TESTE RÁPIDO?

Os testes rápidos são propostos na HIVberodung segundas e quartas das 17h às 19h e no Dimps (Intervenção de Dispositivos Móveis para a Promoção da Saúde Sexual). Os horários e locais da passagem do Dimps estão disponíveis no site www.dimps.lu.



OS TESTES RÁPIDOS VENDIDOS NA INTERNET SÃO FIÁVEIS?

Os países da União Europeia não deram autorização para a compra e venda de testes pela internet. Não se aconselha comprar um teste rápido de rastreio do VIH na internet. Em primeiro lugar, a sua fiabilidade não está comprovada e depois, fazer um teste de rastreio não é um gesto simples e a leitura dos resultados exige o enquadramento de pessoas qualificadas para uma correta interpretação do teste. Se quiser fazer um teste rápido, dirija-se ao serviço HIVberodung onde lhe podem dar um conselho personalizado.

QUANTO TEMPO TENHO DE ESPERAR PARA TER OS RESULTADOS DO MEU TESTE?

Em geral, os resultados estão disponíveis três dias úteis depois de efectuado o teste.

TENHO DE PAGAR UM TESTE DO VIH?

NÃO, o teste de rastreio é gratuito, é pago pela Caixa Nacional de Saúde e, em caso de anonimato, é pago pelo Ministério da Saúde.

POSSO FAZER UM TESTE APESAR DE AINDA SER MENOR DE IDADE?

SIM, não há idade legal para se fazer um teste de rastreio. No entanto, é importante saber que os profissionais só são obrigados a respeitar o segredo profissional se o menor não estiver em perigo. Em caso de um resultado positivo e de necessidade de acompanhamento médico, o médico pode propor ajuda para informar os pais.

O MEU MÉDICO RECEITA-ME ANÁLISES AO SANGUE COM REGULARIDADE, POR ISSO SUPONHO QUE O TESTE DO VIH ESTÁ AUTOMATICAMENTE INCLUÍDO NA LISTA DE ANÁLISES?

NÃO, o teste de rastreio do VIH não é realizado sistematicamente quando se fazem análises ao sangue. Se pretender fazer a depistagem, é necessário pedi-lo explicitamente.

Um médico não pode prescrever-lhe um teste do VIH sem seu consentimento prévio!

POSSO SER OBRIGADO(A) A FAZER UM TESTE DE RASTREIO?

NÃO, legalmente, ninguém pode obrigá-lo(a) a fazer um teste de rastreio do VIH. Contudo, a maioria das companhias de seguros de vida pedem um teste de rastreio para avaliação do montante do valor do seguro. Em caso de seropositividade, podem recusar o seguro de vida ou aceitá-lo mediante um aumento do preço do valor a pagar.

O MEU PARCEIRO (A MINHA PARCEIRA) MOSTROU-ME OS RESULTADOS DAS SUAS ANÁLISES E SÃO NEGATIVOS, POSSO CONFIAR NELE (NELA)?

Os resultados da análise do seu parceiro (da sua parceira) só são fiáveis se tiver a certeza de que ele ou ela não tiveram nenhuma situação de risco durante as 12 semanas anteriores ao teste e entre o momento do teste e o momento em que lhe mostra os resultados.



LÉXICO

Anticorpos: fabricados pelos glóbulos brancos, os anticorpos são a resposta do sistema imunitário a uma infecção; podemos compará-los a “armas” fabricadas para lutar contra infecções.

Antígenos: são substâncias estranhas ao organismo que vão causar uma reacção do sistema imunitário, como o fabrico de anticorpos

IST: Infecção Sexualmente Transmissível: infecção frequentemente sem sintomas que se pode transmitir nas relações e/ou com as carícias sexuais. Por exemplo: a gonorreia, a clamídia, a sífilis, herpes.

PEP: Profilaxia após a Exposição: Tratamento de urgência administrado após uma possível exposição eventual ao VIH. O tratamento de urgência só é eficaz se for iniciado dentro de um prazo máximo de 72 horas após a situação de risco.

Sistema Imunitário: sistema de defesa do organismo que luta contra diversas infecções, bactérias, micróbios, vírus, parasitas, etc.

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

VHC: Vírus da hepatite C. O vírus da hepatite C se transmite pelo sangue. As situações de risco de transmissão mais frequentes são: compartilhar material de injeção de droga por via intravenosa, dividir material para inalar droga e penetração anal.

MORADAS ÚTEIS

HIVberodung - Croix-Rouge

94, Blvd. Patton
L-2316 Luxembourg
T: 2755 4500
Testes rápidos às segundas e quartas das 17h às 19h

www.aids.lu
www.sida.lu

Stop Aids Now/Acces

c/o HIVberodung - Croix-Rouge
94, Blvd Patton
L-2316 Luxembourg
T: 406 251

www.sida.lu

Centre Hospitalier (CHL)

Service des Maladies Infectieuses (2^e andar)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
Teste de rastreio todos os dias úteis das 7h às 15h

www.chl.lu

Hôpital Kirchberg

9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Testes de depistagem, dias úteis das 7h às 19h, sábado 7h às 10h

www.hkb.lu

Zitha Klinik

36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
Teste de rastreio todos os dias úteis das 11h às 18h

www.zitha.lu

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
Teste de rastreio todos os dias úteis das 7h às 17h

www.chem.lu

Centre Hospitalier du Nord - St Louis

120, Avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück
Teste de rastreio todos os dias úteis das 10h às 14h

www.chdn.lu

LNS

[Laboratoire National de Santé]
1, rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
Testes de depistagem, dias úteis 7h³⁰ às 16h
T: 281 001

www.lns.lu

DIMPS

[Dispositif d'Intervention Mobile pour la Promotion de la Santé sexuelle]
Os locais e os horários de passagem do DIMPS podem ser consultados em
www.dimps.lu

Ministère de la Santé

Direction de la Santé
Division de la Médecine Préventive et Sociale
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
www.sante.lu

Laboratoires Ketter-Thill

T: 488 288 1
www.llam.lu

Laboratoires Forges du Sud

T: 518 058
www.labtalon.lu

Laboratoires Réunis

T: 780 290 1
www.labo.lu



WWW.S



SIDA.LU



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la santé

croix-rouge 
luxembourgeoise
Santé **HIV Berodung**
Hépatites, IST et VIH



www.sida.lu

Sante.lu