




Informação importante após a vacinação

Hoje recebeu uma vacina contra o vírus Mpox.
Gostaríamos de lhe lembrar alguns aspetos importantes relativos a esta vacinação.

Esquema vacinal

A vacinação primária com uma vacina contra o vírus Mpox requer duas doses com 28 dias de intervalo e uma terceira dose numa pessoa imunodeprimida. Um intervalo de pelo menos 28 dias é importante para assegurar uma alta eficácia da vacina. No Luxemburgo, e no resto da União Europeia, as vacinas recomendadas são IMVANEX® e JYNNEOS®, produzidas pela empresa Bavarian Nordic. Os folhetos informativos da vacina estão disponíveis no site

www.sante.lu/mpox



O que devo fazer depois de ter recebido a vacina?

As reações adversas ou efeitos secundários mais frequentemente descritos são reações no local da injeção. A maioria destas reações são de intensidade ligeira a moderada e desaparecem no prazo de sete dias sem tratamento. As pessoas que são vacinadas após contacto com uma pessoa infetada com o vírus Mpox devem continuar o autocontrolo e manter medidas de higiene durante até **21 dias após** o contacto, uma vez que os sintomas da doença podem aparecer dentro deste período.

O que devo fazer se tiver uma reação adversa?

Efeitos secundários graves: Contacte imediatamente um médico ou dirija-se ao serviço de urgência do hospital mais próximo se sentir algum dos sintomas seguintes:



Dificuldade em respirar




Sensações vertiginosas



Inchaço do rosto e pescoço

Estes sintomas podem ser um sinal de uma reação alérgica grave.



Outros efeitos secundários: Se sentir um ou mais efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isto aplica-se a qualquer reação adversa que possa estar relacionada com a vacina administrada. Pode também comunicá-los diretamente através do sistema nacional de notificação:

← www.guichet.lu/pharmacovigilance.

Se tiver qualquer outra pergunta sobre a vacinação, consulte por favor o seu médico ou farmacêutico.

No caso de urgência, ligue para o 112.